


ID del test

Data

Riferimento

**Piano lontano****Tipo di sguardo**

Sguardo panoramico

**Rapporto di ampiezza**


Rapporto ellittico orizzontale

**Vettore di frequenza massima**

Spostato verso alto

**Diagnosi**

Si usa l'intero campo visivo binoculare (180°). In particolare, si seguono gli stimoli soprattutto con lo sguardo nel campo visivo orizzontale, con un movimento meno intenso del capo.

**Piano intermedio****Tipo di sguardo**

Sguardo panoramico

**Rapporto di ampiezza**


Rapporto ellittico orizzontale

**Vettore di frequenza massima**

Spostato in basso

**Diagnosi**

Si usa l'intero campo visivo binoculare (180°). In particolare, si seguono gli stimoli con lo sguardo soprattutto nel campo visivo orizzontale, con un movimento meno intenso del capo. Da distanza intermedia, si consiglia una lente che fornisca un campo visivo orizzontale ampio.

**Piano vicino****Tipo di sguardo**

Sguardo panoramico

**Rapporto di ampiezza**

Rapporto ellittico orizzontale

**Vettore di frequenza massima**

Spostato a sinistra

**Diagnosi**

Si usa l'intero campo visivo binoculare (180°). In particolare, si seguono gli stimoli nel campo visivo orizzontale soprattutto con lo sguardo, con un movimento meno intenso del capo. Da vicino, si consiglia una lente con un campo visivo orizzontale senza limitazioni e privo di aberrazioni.